Name/ lat.	Herkunft	Standort	Klima	Wasser	Lichtbedarf	Wüchsigkeit	Umtriebszeit		Krankheitsgefahren	Bieneneignung	Bodenwirkung
Ahorn/ acer	Nordhalbkugel	nährstoffr.			Halbschatten		120 - 140 J		Mehltau, Teerflecken		bodenpflegend
Feld-/	Eurasien			feucht		weniger sch			Rindenschorf	sehr gut	bodenpflegend
Spitz-/ a. platanoides	Eurasien	weniger	hitzeertr.	trocken		weniger sch				sehr gut	bodenpflegend
Berg-/	Eurasien		hitzeempf	feucht		schnell				sehr gut	bodenpflegend
Erle/ alnus	Nordhalbkugel	nährstoff-	frosthart	nass	hoch	schnell bis	60 - 80 Jahre		Wurzelpilz		
Schwarz-/alnus glutinosa	Nordhalbkugel	reich				mäßig					
Birke/ betula	Nordhalbkugel	extrem arm	frosthart	extrem	hoch	schell	40 - 60 Jahre		Insekten		gut
Sand-/ b. pendula	Eurasien										
Moor-/ b. pubescens	Eurasien										
Hainbuche/	M+SO Europa	weniger	hitzeertr.	trocken	Halbschatter	langsam	60 - 100 Jahre				gut
carpinus betulus		Ansprüche			Schatten						
Esche/ fraxinus excelsior	Nordhalbkugel	nährst.reich	Frostempf	feucht	hoch	weniger sch	80 - 120 Jahre		Eschentriebsterben		gut
Pappel/ populus	Nordhalbkugel	anspuchs-	anspruchs-	anspruchs-	hoch	sehr schnell	30 - 50 Jahre				mäßig
Schwarz-/ p. nigra	M Europa	los	los	los							
Siber-/ p. alba	M Europa										
Zitter-, Aspe/ p. tremula	Eurasien										
Grau-/ p. canescens	Hybride										
Robinie/	N.Amerika	anspruchs-	frosthart	trocken	hoch	schnell	40 - 60 Jahre		Miniermotte	sehr gut	bodenpflegend
robinia pseudoacacia		los	hitzeertr.								
Eiche/ quercus	Nordhalbkugel	nährstoff-	hitzeertr.	trocken-	hoch	langsam bis	180 - 300 J		Eichenprozessions-		gut
Stiel-/ q. robur	M Europa	arm		verträglich		weniger sch			spinner EPS		gut
Trauben-/q. petraea	M Europa						100 -120 J				mäßig
Rot-/ q. rubra	N.Amerika					schnell					
Linde/ tilia	Nordhalbkugel	anspruchs-	wärme-	feucht	Sonne bis	schnell bis	100 -120 J		Milben		bodenpflegend
Winter-/ t. cordata	M Europa	los	liebend		Schatten	weniger sch				sehr gut	
Sommer-/ t. platyphyllos	südl. Europa									sehr gut	
Ulme/ ulmus	Nordhalbkugel	besser ver-	mäßig	feucht	hoch	weniger sch	120 - 140 J		Ulmensterben		
Flatter-/ u. laevis	M Europa	sorgt	trocken								
Feld-/ u. carpinifolia	M Europa										
Buche/ fagus	Nordhalbkugel	nährstoff-	hitzeempf	feucht	Schatten	schnell	120 - 160 J				bodenpflegend
Rot-/ f. sylvatica	M Europa	reich									